

Bệnh	Vắc-xin	19–26 tuổi	27–49 tuổi	50–59 tuổi	Từ 60 tuổi
	Vắc-xin cúm bất hoạt IV4	Tiêm chủng hàng năm 1 MŨI			
Bạch hầu - Uốn ván - Ho gà	Vắc-xin phối hợp có chứa thành phần BH & HG giảm liều	1 MŨI Tdap sau đó nhắc lại Td hoặc Tdap mỗi 10 năm			
Phế cầu	PCV13	1 MŨI			1 MŨI
Viêm não Nhật Bản	VNNB bất hoạt tế bào Vero	2 MŨI - cách nhau 28 ngày + 1 mũi (mũi 3) sau 1 năm			
	VNNB sống giảm độc lực, tái tổ hợp	1 MŨI			
Não mô cầu	NMC_nhóm B có 4 kháng nguyên (4CMenB)	2 MŨI - cách nhau 1 tháng			
	NMC_ACWY cộng hợp	1 MŨI (tới 55 tuổi)			
Sởi - Quai bị - Rubella	MMR	2 MŨI - cách nhau 1 tháng			
Thủy đậu	Thủy đậu	2 MŨI - cách nhau 1 tháng		2 MŨI - cách nhau 1 tháng	
Viêm gan B	VGB đơn giá	3 MŨI - 0, 1, 6 tháng - CẦN TEST TRƯỚC KHI TIÊM			
Viêm gan A	Hep A_VGA đơn giá/phối hợp	VGA ĐƠN - 2 MŨI (0, 6 THÁNG) , CGA PHỐI HỢP - 3 MŨI (0, 1, 6 THÁNG)			
Ung thư cổ tử cung và các bệnh khác do HPV	HPV	3 MŨI - 0, 2, 6 tháng			
	Rabbies	5 MŨI TIÊM BẮP HOẶC 8 MŨI TIÊM TRONG DA (4 NGÀY 2 VỊ TRÍ) - sau phơi nhiễm. Nếu đã tiêm vắc-xin đại trước đó, tiêm 2 mũi ngày 0-3			
Thương hàn	Typhoid	1 MŨI - nhắc lại mỗi 3 năm nếu có phơi nhiễm			
Sốt vàng	Stamaril	1 MŨI - nhắc lại mỗi 10 năm nếu sống trong vùng dịch lưu hành			

Khuyến cáo theo tuổi cho nhóm chưa tiêm đủ

Khuyến cáo cho nhóm nguy cơ

Khuyến cáo sau khi bị phơi nhiễm